

# Szeregi liczbowe

Wykład nr 8 (Inżynieria sanitarna)

- Uwagi ogólne o szeregach
- Szeregi o wyrazach nieujemnych
- Szeregi przemienne

**Przykład 1.** Dany kwadrat o polu powierzchni równym 1 podzielmy na dwie równe części. Pole powierzchni jednej z nich oznaczmy przez  $a_1$ , a drugą podzielmy znów na równe części. Pole powierzchni jednej z nich oznaczmy przez  $a_2$ , a drugą podzielmy znów na równe części i tak dalej. Otrzymujemy nieskończony ciąg prostokątów o polach powierzchni  $a_n = \frac{1}{2^n}$  dla  $n \in \mathbb{N}$ . (Rys.) Utwórzmy sumę otrzymanych prostokątów:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

i zauważ, że operacji dodawania, ze względu na nieskończoną liczbę składników, nie można efektywnie wykonać dodając kolejne składniki. Z drugiej strony, ze względu na konstrukcję ciągu  $(a_n)$ , nietrudno spostrzec, że po dodaniu wszystkich jego wyrazów suma wyniesie 1. Przykład ten prowadzi do pojęcia szeregu i jego sumy.

**Definicja 1.** (*nieskończony szereg liczbowy*)

Przez szereg liczbowy nieskończony oznaczony symbolem

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \dots \quad \text{lub} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

rozumiemy ciąg sum:

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1, \\ s_2 &= a_1 + a_2, \\ &\dots\dots\dots \\ s_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Liczby  $a_1, a_2, \dots$  nazywamy *wyrazami szeregu*, a symbol  $a_n$  nazywamy *wyrazem ogólnym szeregu*. Wyrazy ciągu  $(s_n)$  nazywamy *sumami częściowymi szeregu*  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

**Definicja 2.** (*szereg zbieżny*) Mówimy, że szereg jest zbieżny, jeżeli ciąg sum częściowych  $(s_n)$  jest zbieżny do granicy właściwej  $s$ , którą wówczas nazywamy sumą szeregu. Stosujemy oznaczenia:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s \quad \text{lub} \quad a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = s.$$

Szereg który nie jest zbieżny, nazywamy szeregiem rozbieżnym.

**Twierdzenie 1.** (*warunek konieczny zbieżności szeregu*)

*Warunkiem koniecznym zbieżności każdego szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest to, aby jego wyraz ogólny dążył do zera, tzn.*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

**Twierdzenie 2.** (o wyłączaniu stałej przed szereg)

Jeżeli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny i jego suma równa się  $s$ , a  $c$  jest liczbą stałą, to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$  jest zbieżny i jego suma jest równa  $cs$ . Jeżeli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny, to przy  $c \neq 0$  szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$  jest też rozbieżny.

**Przykład 2. Szereg geometryczny**

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}, \quad \text{czyli} \quad a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots$$

*jest zbieżny, gdy  $|q| < 1$  i wówczas suma jego wynosi*

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}.$$

*Szereg geometryczny jest natomiast rozbieżny, gdy  $|q| \geq 1$ .*

**Przykład 3. Szereg harmoniczny**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \text{czyli} \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

jest rozbieżny do  $\infty$ .

**Przykład 4. Szereg harmoniczny rzędu  $\alpha$**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}, \quad \text{czyli} \quad 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{n^{\alpha}} + \dots,$$

gdzie  $\alpha > 0$  jest dla  $\alpha > 1$  zbieżny, a dla  $\alpha \leq 1$  jest rozbieżny.  
Dla  $\alpha = 1$  otrzymujemy szereg harmoniczny.

**Twierdzenie 3.** (kryterium Cauchy'ego\*)

Dla szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  o nieujemnych wyrazach przyjmijmy:

$$p := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

Jeżeli

- $p < 1$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny;
- $p > 1$ , to szereg ten jest rozbieżny;
- $p = 1$ , to szereg ten może być zbieżny albo rozbieżny.

\*Augustin Louis Cauchy (1789-1857) - matematyk francuski.



**Twierdzenie 4.** (kryterium d'Alemberta\*)

Dla szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  o dodatnich wyrazach przyjmijmy:

$$p := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Jeżeli

- $p < 1$ , to szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny;
- $p > 1$ , to szereg ten jest rozbieżny;
- $p = 1$ , to szereg ten może być zbieżny albo rozbieżny.

\*Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) - filozof i matematyk francuski.

**Ćwiczenie 1.** Zbadać zbieżność szeregu:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{n!};$

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^n \cdot n!};$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2 e^n};$

d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n};$

e)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n;$

f)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n+2}{2n-1} \right)^{n^2}.$

**Twierdzenie 5.** (kryterium porównawcze)

*Jeżeli dla dowolnych dwóch szeregów o wyrazach nieujemnych*

*$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  i  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  istnieje  $n_0 \in \mathbb{N}$  takie, że*

$$a_n \leq b_n \quad \text{dla } n \geq n_0,$$

*to ze zbieżności szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  wynika zbieżność szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*

*i z rozbieżności szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  wynika rozbieżność szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .*

*Uwaga 1.* Przy stosowaniu kryterium porównawczego do badania zbieżności niektórych szeregów pomocne będą następujące nierówności:

- a)  $\frac{x}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$  dla  $x \in [0, 2]$ ,
- b)  $\frac{x}{2} \leq \sin x \leq x$  dla  $x \in [0, \frac{3\pi}{4}]$ ,
- c)  $\sin x \leq x \leq \tan x$  dla  $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ ,
- d)  $x \leq \tan x \leq 2x$  dla  $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ .

**Ćwiczenie 2.** Zbadaj zbieżność szeregów:

- a)  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{1}{3^n}$ ;
- b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left( \tan \frac{1}{n} \right)$ ;
- c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)$ ;
- d)  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$ .

**Definicja 3.** (*szereg przemienny*)

Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  nazywamy przemiennym, jeżeli jego wyrazy są naprzemian dodatnie i ujemne.

**Twierdzenie 6.** (kryterium Leibniza\*)

Jeżeli w szeregu przemiennym  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  począwszy od pewnego miejsca  $n_0$  bezwzględne wartości wyrazów szeregu dążą monotonicznie do zera, tzn. dla każdego  $n > n_0$  spełnione są warunki:

$$|a_{n+1}| \leq |a_n|,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

to szereg jest zbieżny.

\*Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) - filozof, matematyk, prawnik i dyplomata niemiecki

**Ćwiczenie 3.** Zbadać zbieżność szeregów:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n};$

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{3} - 1);$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin n.$

**Twierdzenie 7.** (kryterium bezwzględnej zbieżności)

Jeżeli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ , którego wyrazy równe są wartościom bezwzględnym wyrazów szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ , jest zbieżny, to i szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest zbieżny.

**Definicja 4.** (szereg bezwzględnie zbieżny)

Szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  nazywamy szeregiem bezwzględnie zbieżnym, jeżeli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  jest zbieżny.

**Definicja 5.** (szereg warunkowo zbieżny)

Szeregiem warunkowo zbieżnym nazywamy szereg zbieżny, który nie jest bezwzględnie zbieżny.

### Przykład 5. Szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

jest bezwzględnie zbieżny, ponieważ szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  jest zbieżny jako szereg harmoniczny rzędu  $\alpha = 2$ .

### Przykład 6. Szereg anharmoniczny

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

jest warunkowo zbieżny. Rzeczywiście szereg ten na podstawie kryterium Leibniza jest zbieżny, a nie jest bezwzględnie zbieżny, gdyż szereg bezwzględnych wartości jego wyrazów stanowi rozbieżny szereg harmoniczny  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ .



**Ćwiczenie 4.** Zbadać zbieżność szeregów:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{2n-1}{2n+2} \right)^n;$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{n-1}{2n+2} \right)^n;$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n};$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \left( \frac{2}{3} \right)^{n-1};$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log n}.$$